

技術情報 vol.1

小豆

発行年月日 2020.05.27
JA 新はこだて厚沢部基幹支店
檜山農業改良普及センター
檜山郡江差町字柳崎町 55 番
TEL 0139-53-6141
FAX 0139-53-6143

■ は種と施肥

- (1) は種は、安定した収量・品質を確保するために、6月上旬～中旬を目安に行いましょう。
(2) 施肥は、窒素量 3～4kg/10a (例：S644 50～70kg/10a) を目安とします。初期生育不良が見込まれる場合は、リン酸資材 (例：ダブリ 20kg/10a) を施用して下さい。

■ 種子消毒

薬剤名	適用病害虫名	使用時期	使用回数	使用量・使用方法
農薬については、地域の指導機関に相談の上、登録内容をよく確認して使用してください				

※まめぞう（根粒菌）を使用する場合、種子消毒剤の塗抹後に処理する。

■ 除草剤

各剤の使用基準を遵守し、生育不良を起こさないように注意してください。

除草剤名	処理方法	使用時期	10a 当り 使用量	対象雑草	使用 回数
農薬については、地域の指導機関に相談の上、登録内容をよく確認して使用してください					

【使用時期は以下の表を参考とする】

は種直後	は種当日～1日後
は種後	は種後2日～5日後
は種後出芽前	は種後2日～出芽2日前
出芽直前	出芽の前日
出芽揃	は種粒数の80%の出芽を認めた日