

技術情報 No. 1

稲作

発行年月日 2023.4.24
JA新はこだて厚沢部営農センター
檜山農業改良普及センター
檜山郡江差町字柳崎町55番
TEL 0139-53-6141
FAX 0139-53-6143

向こう1週間の気温は、平年並みからやや高めが予測されています。
温度管理に十分留意しましょう！

1 は種～出芽揃いまでの管理


- ・ 出芽揃いまでの高温（35℃以上）で、ヤケや生育ムラを生じます。
- ・ 被覆期間は、天候に応じたハウスの開閉管理に徹しましょう！！

①出芽揃いまでの適温（種籾周辺の温度）

適温は30～32℃、35℃以上になったらキケン！

出芽揃いまでは、箱内の土の温度
が目安 →「目標32℃」

温度計



②被覆資材の除去

出芽率 80%以上 となったら除去します。

2 出芽揃い～1.5葉までの管理

①温度管理

温度は、20～25℃ とします。

※出芽後の高温管理は、徒長の原因となるのでご注意ください！

②水分不足のサインに注意！！

早朝、葉先の水滴が少ない、葉先の展開が悪い等が見られたら
できるだけ、晴れた日の午前中にかん水してください。

③追肥

1.0～1.5葉時、窒素分量で1g/箱 追肥しましょう。
(密播中苗の場合：2g/箱)

農作業事故には十分注意しましょう！